



Brot de tinya entre els adolescents, què és i què provoca aquesta infecció?

[inicentrareport]Els talls de cabell degradats i rasurats estan molt de moda, però tenen **conseqüències negatives per la salut**. Com expliquen alguns dermatòlegs, aquests pentinats són els responsables de l'augment de casos de **tinya del cuir cabellut** en adolescents.

Segons un comunicat de l'AEDV (Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia), aquests casos de tinya s'expliquen pel **manteniment que requereixen els pentinats degradats o rasurats**, ja que obliga a acudir sovint a la perruqueria i **augmenta el risc de contagi a través de maquinetes elèctriques contagiades**.

Com explica Leonardo Bascón, dermatòleg del Servei de Dermatologia de l'Hospital General de Granollers, "és probable que **el material de rasurat contaminat s'estigui compartint entre els diferents clients** d'algunes perruqueries que no estarien tenint en compte les normes de desinfecció del material".

La tinya del cap o "tinea capitis" és una malaltia altament contagiosa que afecta principalment a nens d'entre 6 mesos i 12 anys d'edat, majoritàriament als barons. **Hi ha tres maneres de transmetre el fong que causa la tinya:**

```
[playbuzz](function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://experience.ex.co/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','exc o-sdk'));
```

[/playbuzz]

Els símptomes varien en funció de la localització. Segons l'AEDV, **a més de descamació, picor i inflamació amb possible supuració, dolor i febre, també pot haver-hi pèrdua de cabell a la zona**. El seu tractament també varia en funció de la localització, però sempre inclou l'aplicació d'antimicòtics o antifúngics a la zona afectada o per via oral.

[facentrareport]